



University of Groningen

Bijdrage tot vaststelling van benige parallel-tests in het systeem Binet-Simon.

Beukema, Jan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1921

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Beukema, J. (1921). Bijdrage tot vaststelling van benige parallel-tests in het systeem Binet-Simon. [Groningen]: [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Kritiseeren van absurde zinnen en verstandsvragen zijn betrouwbare tests voor het intelligentie-onderzoek bij geesteszieken.

II.

Voor toepassing van het systeem van BINET-SIMON is noodzakelijk, dat een of meerdere parallelserieën opgesteld worden.

III.

Bij langdurige ischias verzuime men niet, het benedengedeelte van de wervelkolom röntgenologisch te onderzoeken.

IV.

Orthostatische albuminurie berust waarschijnlijk op circulatiestoornis in de linkernier.

V.

De open punctie volgens A. SCHMIDT van pleuritisch exsudaat verdient de voorkeur boven gesloten punctie.

VI.

De door GOLDSTEIN aanbevolen diagnostische punctie van de trachea bij stenose-verschijnselen is niet aan te bevelen.

VII.

Voor huidesinfectie bij laparotomie gebruike men geen jodiumtinctuur.

VIII.

Voor het plombeeren van etterende beenholten gebruike men levend vetweefsel.

IX.

Bij daling van de frequentie der foetale harttonen beneden 100 gedurende een weeën-pauze, houde men zich gereed, om ingeval van blijvende daling, den partus, indien mogelijk, snel te termineeren.

X.

De onlangs door POULARD wederom aanbevolen behandeling van traanzakstenose door zoogenaamde stricturotomie, verdient geene aanbeveling.

XI.

Bij locale behandeling van de tuberculeuse halslymphklieren overwege men tonsillectomie.

XII.

Ten platten lande drage men het toezicht op de zuigelingenverzorging op aan de daarvoor voorbereide voedvrouw.
